


De reținut:

- Denumirile fișierelor și folderelor trebuie să fie în conformitate cu cerințele.

Crearea unui nou folder pe Desktop

- Poziționați-vă pe Desktop
- Creați un nou folder [click dreapta de mouse și utilizați opțiunea Folder-> New].

**Salvarea unui fișier Excel anterior creat într-un anumit folder**


- Descărcați fișierul **BD_LP05_TD** de pe site (el se va salva automat în folderul Downloads)
- Deschideți fișierul **BD_LP05_TD** și apoi resalvați fișierul în folderul specificat în exercițiu (Lab04) utilizând opțiunea: File- Save As-Desktop-folder **Lab05**

Calculul statisticilor descriptive (medie, mediană, modul, deviație standard) prin funcții predefinite


- la dreapta bazei de date, în aceeași foaie de calcul (de ex. în coloanele M și N), aveți dat un tabel de forma:

M	N
TABEL 1	
	Adaptarea marginala (micrometri)
Medie	
Mediana	
Modul	
Deviație standard (DS)	
Cuartila 1 (Q1)	
Cuartila 3 (Q3)	
Coeficient de variație (CV)	

- Poziționați-vă în acest tabel, pe celula unde doriți să obțineți rezultatul mediei și folosiți opțiunea **Formulas->Insert Functions**



- Se selectează funcția dorită (de exemplu, pentru media aritmetică se va alege funcția AVERAGE)



- În fereastra funcției AVERAGE pentru argumentul Number1 se vor selecta celulele cu valorile adaptării marginale pentru cele 200 lucrări protetice (de ex. D2: D201).

Function Arguments

AVERAGE

Number1: D2:D201 = {120;116;102;123;94;97;79;116;136;77;116;90;78;...}

Number2: = number

= 100

Returns the average (arithmetic mean) of its arguments, which can be numbers or names, arrays or references that contain numbers.

Number1: number1,number2,... are 1 to 255 numeric arguments for which you want the average.

Formula result = 100

[Help on this function](#) OK Cancel

L	M
TABEL 1	
	Adaptarea marginala (micrometri)
Medie	100
Mediana	
Modul	
Deviație standard (DS)	
Cuartila 1 (Q1)	
Cuartila 3 (Q3)	
Coeeficient de variație (CV)	

- Pentru calculul medianei se va folosi funcția **MEDIAN**
- Pentru calculul modulului se va folosi funcția **MODE**
- Pentru calculul deviației standard se va folosi funcția **STDEV.**

Calcul cuartile (Q1 si Q3) utilizând funcția **QUARTILE**

- Pozitionare pe celula goala de langa cuartila 1->Se cauta din Formulas->Insert Functions-> **QUARTILE**

Sintaxa functiei se va completa astfel:

Array: valorile vârstei pentru pe tot esantionul

Quart: ordinul cvartilei

Function Arguments

QUARTILE

Array: D2:D201 = {120;116;102;123;94;97;79;116;136;77;116;90;78;10}

Quart: 1 = 1

= 84

This function is available for compatibility with Excel 2007 and earlier.
Returns the quartile of a data set.

Quart is a number: minimum value = 0; 1st quartile = 1; median value = 2; 3rd quartile = 3; maximum value = 4.

Formula result = 84

[Help on this function](#) OK Cancel

- **Calculul cuartilei 3 (Q3) se va realiza similar;**

Calcul coeficient de variație

- Se aplica formula dată, ținând cont ca deviația standard a variabilei Adaptare marginala se află în celula N7 iar media aritmetica a variabilei Vârsta se află în celula N4, deci formula devine: $=N7/N4*100$

Interpretare coeficient de variație

- Dacă $CV < 10\%$ atunci valorile adaptarii marginale pot fi considerate omogene (in jurul mediei)
- Dacă $10 \leq CV < 20\%$ atunci valorile adaptarii marginale pot fi considerate **relativ** omogene (in jurul mediei)
- Dacă $20 \leq CV < 30\%$ atunci valorile adaptarii marginale pot fi considerate **relativ** eterogene (in jurul mediei)
- Dacă $CV \geq 30\%$ atunci valorile adaptarii marginale pot fi considerate eterogene (in jurul mediei)

Realizarea unui grafic de tip box-plot pentru o variabilă CANTITATIVA

- **Selectam valorile Adaptarii marginale din foaia de calcul Date**
- **Alegem opțiunea Insert → Chart → ALL charts → Box and Whisker**

File Home **Insert** Page Layout Formulas Data Review View Help

PivotTable Recommended PivotTables Tables Pictures Icons 3D Models Illustrations Get Add-ins My Add-ins Add-ins Recommended Charts Charts **Fig** Tours Sparklines

Insert Chart

Recommended Charts **All Charts**


Recent Templates Column Line Pie Bar Area X Y (Scatter) Map Stock Surface Radar Treemap Sunburst Histogram **Box & Whisker** Waterfall

Box and Whisker

Chart Title

	A	B	C	D	E	F	G
1	Varsta (ani)	Gen (M/F)	Mediu (U/R)	Greutate (kg)	Înălțime (cm)	Glicemie (mg/dL)	Colesterol (mg/dL)
2	38	M	U	92	175	98	198
3	49	M	R	57	170	98	211
4	44	F	R	89	151	73	203
5	52	F	R	108	185	91	231
6	49	M	U	107	139	81	206
7	54	M	U	68	182	98	285
8	51	F	R	68	173	77	210
9	39	F	U	92	154	85	233
10	41	M	R	60	166	77	216
11	49	F	U	73	148	76	216
12	48	M	R	87	172	82	216
13	48	F	R	87	178	92	210
14	55	M	R	63	162	90	206
15	56	M	R	76	161	92	219
16	55	F	R	64	176	92	156
17	48	F	U	69	159	64	209

- Graficul obținut va fi de forma



IQR = distanța intercuartilică = $Q3 - Q1$

Mustățile reprezintă intervalul de valori care sunt considerate normale pentru variabila de studiu (intervalul de „normalitate” este dat de limita inferioara și limita superioara).

Punctele di afara mustăților (outlieri): valori neobisnuite

Interpretare grafic:


- Dacă mediana este centrată în cutie ($\approx$ media) iar mustățile sunt aproximativ egale → **distribuție normală** de probabilitate
- Dacă mediana este mai aproape de Q1 și mustața de sus este mai mare (lungă) → **distribuție cu asimetrie pozitivă**
- Dacă mediana este mai aproape de Q3 și mustața de jos este mai mare (lungă) → **distribuție cu asimetrie negativă**

Calcul statisticilor descriptive utilizând pachetul de funcții **DATA ANALYSIS**:

Pas 1. Verificați dacă în meniul Data există instalat pachetul Data Analysis.

Dacă nu îl găsiți atunci parcurgeți următoarele etape pentru instalarea lui:

- Buton File- Options-Add-Ins-click buton Go de la opțiunea Manage-Excel-Add-Ins-analysis Toolpack-validare prin OK (vezi mai jos)



Pas 2. In tab-ul **DATA** se cauta pachetul **Data Analysis**, se caută opțiunea **Descriptive Statistics**

- Dublu click pe aceasta optiune;
- În căsuța corespunzătoare la **Input Range** selectați toate celulele care conțin valorile variabilelor cantitative!!!-vezi imaginea de mai jos:

- Specificați că aveți denumiri de coloană în primul rând (bifați **Labels in first row**).
- În secțiunea **Output** options: alegeți să afișați rezultatele începând cu celula K1 și explicați programului să calculeze toate statisticile descriptive (bifați **Summary statistics**).
- **Rezultatele obținute vor fi de forma:**

G	H	I	J	K	L	M	N
<i>Timp de modelare in ceara (min)</i>		<i>Contractie la sinterizare (%)</i>		<i>Adaptare marginala (μm)</i>		<i>Timp de polimerizare rasina acrilica (min)</i>	
Mean	88.64	Mean	25.69	Mean	100.00	Mean	94.38
Standard Error	1.47	Standard Error	0.25	Standard Error	1.44	Standard Error	1.01
Median	90.00	Median	25.46	Median	100.00	Median	94.00
Mode	120.00	Mode	20.40	Mode	116.00	Mode	87.00
Standard Deviation	20.72	Standard Deviation	3.48	Standard Deviation	20.30	Standard Deviation	14.24
Sample Variance	429.50	Sample Variance	12.14	Sample Variance	411.99	Sample Variance	202.80
Kurtosis	-1.25	Kurtosis	-0.40	Kurtosis	-0.54	Kurtosis	-1.14
Skewness	-0.13	Skewness	0.29	Skewness	0.00	Skewness	0.10
Range	66.00	Range	16.14	Range	90.00	Range	50.00
Minimum	54.00	Minimum	18.83	Minimum	55.00	Minimum	70.00
Maximum	120.00	Maximum	34.98	Maximum	145.00	Maximum	120.00
Sum	17728.00	Sum	5138.48	Sum	20000.00	Sum	18875.00
Count	200.00	Count	200.00	Count	200.00	Count	200.00

✓ **Identificati (colorati) in tabelul d-voastra acele statistici descriptive specificate în enunțul problemei:**

- ✓ Parametrii de centralitate: medie (engl. Mean), mediana (engl. Median), modul (engl. Mode)
- ✓ Parametrii de dispersie: deviație standard, eroare standard
- ✓ Parametrii de asimetrie: asimetrie (engl. Skewness); boltire (engl. Kurtosis)

Distributie simetrică a variabilei de interes

- Dacă media aritmetică a valorilor variabilei de studiu este aproximativ egală cu mediana și modulul atunci vom spune că distribuția variabilei este simetrică ($Ma \approx Me \approx Mo$)

Distributie Gaussiană (normală) a variabilei de interes

- Dacă media aritmetică a valorilor variabilei de studiu este aproximativ egală cu mediana și modulul și în plus coeficientii de asimetrie și boltire sunt în jurul lui 0 (intervalul [-1; 1]) vom spune că distribuția variabilei este normală (Gaussiană)

Sortarea datelor în raport cu un criteriu


- Dacă dorim să sortăm pacienții în raport cu genul pacienților
- Se selectează toată baza de date
- Se alege din meniu opțiunea **Sort & filter → CUSTOM SORT**
- **Se selectează criteriul (variabila) în funcție de care se realizează sortarea datelor**

Id_lucrare	Timp de modelare in ceara (min)	Contractie la sinterizare (%)	Adaptare marginala (µm)	Timp de polimerizare rasina acrilica (min)	Tehnologia folosită	Necesita refacere (da/nu)	Tip de material
L001	89	29	120	104	conventionala	da	mod
L002	56	25	116	74	conventionala	da	redu
L003	55	22	102	72	conventionala	da	redu
L004	119	27	123	78	conventionala	da	mod
L005	84	21	94	120	conventionala	nu	redu
L006	73	24	97	87	conventionala	nu	redu
L007	72	31					cres
L008	102	30					mod
L009	90	26					mod
L010	78	29					mod
L011	115	28					mod
L012	112	24					redu
L013	74	25					mod
L014	107	22					redu
L015	91	27					mod
L016	90	28					mod
L017	69	21					redu
L018	58	23					redu
L019	119	21					redu
L020	96	20					redu
L021	81	26					mod

- Validăm prin OK.

Realizarea unui grafic de tip box-plot pentru o variabilă CANTITATIVĂ pe subgrupuri

- Selectăm coloana Sex și Vârsta din foaia de calcul Date
- Alegem opțiunea Insert → Chart → **ALL charts → Box and Whisker**



- Grafic final:

